

Tentamen i MVE 015 Analys i en variabel I, 5 p, 06 08 24, kl 14.00–18.00.

1. Beräkna

$$(a) \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \quad (b) \int_0^1 \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+\sin^2 \sqrt{x})} dx \quad \text{om den konvergerar.}$$

Motivera i (b) annars att den divergerar.

3p+4p

2. Lös differentialekvationerna

$$(a) y' - xy^2 = (xy)^2, y(0) = 1 \quad (b) y'' + 4y' + 3y = xe^{2x}.$$

3p+4p

3. Avgör om den kontinuerliga funktionen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - \sin x^3}{x^2 \cos x} & \text{när } x \neq 0, \\ 0 & \text{när } x = 0. \end{cases}$$

har ett lokalt maximum eller minimum (eller ingetdera) i $x = 0$.

6p

4. För vilka värden på x konvergerar potensserien

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{2k+1}?$$

Motivera nogal!

6p

5. När kurvan $y = x^2 + x$, $0 \leq x \leq 1$ roterar runt y -axeln avgränsas en kropp (som innehåller ett segment av y -axeln). Beräkna volymen av den.

6p

6. Lös differentialekvationen

$$y'' + 9y = u(t-1), y(0) = y'(0) = 0,$$

när $t > 0$.

6p

7. I uppgiften förutsätts en deriverbar parametriserad kurva $(x(t), y(t))$ vara given.

(a) Vad menas med farten till den parametriserade kurvan när $t = t_0$.

2p

(b) Hur beräknas (generellt) längden av kurvan när $a \leq t \leq b$?

2p

(c) Beräkna längden av kurvan (t^2, t^3) när $0 \leq t \leq 1$.

2p

8. Formulera och bevisa medelvärdessatsen för integraler.

6p

Förslag till lösningar kommer att finnas på kursens webbsida

<http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve015/0506/>

Betygsgränser: 20p för trea, 30p för fyra och 40p för femma (inklusive bonus från laborationer i MATLAB).

JAS

FORMELBLAD PÅ BAKSIDAN!

Formelblad

Trigonometriska formler

$$\begin{aligned}\cos(x+y) &= \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y & \sin(x+y) &= \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y & \tan(x+y) &= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y} \\ \cos x \cdot \cos y &= \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)) & \sin x \cdot \cos y &= \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)) & \cos^2 x &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \\ \sin x \cdot \sin y &= \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)) & & & \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)\end{aligned}$$

Maclaurinserier

$$\begin{aligned}e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots \quad \text{för alla } x \\ \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2k!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots \quad \text{för alla } x \\ \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots \quad \text{för alla } x \\ \ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^k \frac{x^k}{k} + \cdots \quad \text{när } |x| < 1 \\ \arctan x &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + \cdots \quad \text{när } |x| < 1 \\ (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{k} x^k + \cdots \quad \text{när } |x| < 1\end{aligned}$$

Lapalcetransformen

Räkneregler

Transformer

$f(t)$	$\tilde{f}(s)$	$f(t)$	$\tilde{f}(s)$
$f'(t)$	$s\tilde{f}(s) - f(0)$	1	$\frac{1}{s}$
$f^{(n)}(t)$	$s^n \tilde{f}(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - s f^{n-2}(0) - f^{n-1}(0)$	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$t^n f(t)$	$(-1)^n \tilde{f}^{(n)}(s)$	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$(f * g)(t)$	$\tilde{f}(s)\tilde{g}(s)$	$\cos bt$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
$f(t+p) = f(t)$ för alla t	$\frac{1}{1-e^{-ps}} \int_0^p f(t)e^{-st} dt$	$\sin bt$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
$u(t-a)f(t-a)$ där $a > 0$	$e^{-as} \tilde{f}(s)$		
$e^{at}f(t)$	$\tilde{f}(s-a)$		