

Tentamen i Matematisk analys i en variabel för I1, MVE 015

2007 12 18 kl. 8.30–12.30.

Hjälpmedel: Inga, ej räknedosa.

Telefon: Ida Säfström, 0762 72 18 60

Lärares närvaro i sal: 9.30 och 11.30

Obs! Ange utbildningsprogram och antagningsår samt namn och personnummer.

1. Lös differentialekvationerna

(a) $y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$

(b) $y'' - 2y' + 5y = x$

(4p+4p)

2. (a) Beräkna $\int x^3 \sin x^2 dx$ (b) Beräkna $\int_2^\infty \frac{1}{x^2 - 1} dx$ om den konvergerar. (4p+4p)
Motivera annars att den är divergent.

3. Avgör om serien är absolutkonvergent, betingat konvergent eller divergent. Motivera dina slutsatser.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n(2n+3)}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

(3p+3p)

4. Beräkna gränsvärdet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x^2 - \sin x^2}{x^4(\ln(1+x) - x)}$ (6p)

5. Kurvan $y = x\sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 1,$ är given.

(a) Beräkna längden av kurvan. (4p)

(b) Beräkna volymen av den kropp som uppstår då kurvan roterar runt x -axeln. (2p)

6. Beräkna summan $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k k(k+1)}$ (6p)

Ledning: Beräkna först summan av potensserien $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k(k+1)}$

7. Redogör för hur man kan uppskatta en summa $\sum_{k=1}^n f(k)$ med en integral. Rita figur, (5p)
ange lämpliga förutsättningar och motivera uppkomna olikheter.

8. Formulera analysens huvudsats (första delen) och härled insättningsformeln, (5p)

$$\int_a^b f(x) dx = [F(b) - F(a)]_a^b \text{ om } F'(x) = f(x) \text{ (dvs andra delen).}$$

Formelsamling finns på baksidan.

Lycka till!

SJ

Trigonometriska formler

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)]$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)]$$

Maclaurinserier

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \quad \text{för alla } x$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \text{för alla } x$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad \text{för alla } x$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad \text{för } -1 < x \leq 1$$

$$\frac{1}{(1-x)} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad \text{för } -1 < x < 1$$

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad \text{för } -1 \leq x \leq 1$$

$$(1+x)^p = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{p}{k} x^k = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!} x^2 + \dots \quad \text{för } -1 < x < 1$$