

**MVE051/MVE055/MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik**

**Hjälpmedel:** Chalmers godkänd miniräknare och en (dubbelvänt) A4 sida med egna anteckningar eller Betaboken.

Tentan rättas och bedöms anonymt. **Skriv tentamenskoden tydligt på placeringlista och samtliga inlämnade papper.** Fyll i omslaget ordentligt.

För godkänt på tentan krävs 12 poäng på tentamen.

För betyg VG för GU studenter krävs 22 poäng.

För betyg 4 resp. 5 för Chalmers studenter krävs dessutom 18 resp. 24 poäng.

Alla svar ska vara motiverade.


Det finns en engelsk och en svensk version av frågorna. Du kan skriva dina svar på bågge av dessa två språk (du kan blanda).

---

**English version**

1. In a study about a parasite that attacks the kidney of rats, it is known that the average number of parasites per kidney is 3. Assume that the number of parasites per kidney follows a Poisson distribution.
  - (a) Given that a rat has two kidneys, calculate the probability that a rat has more than 3 parasites. (1p)
  - (b) Calculate the probability of having at least 9 rats infected in a sample of 10 rats. (2p)
2. Let  $C$  and  $D$  be two events. Suppose  $P(C) = 0.5$ ,  $P(C \cap D) = 0.2$  and  $P((C \cup D)') = 0.4$  where  $(C \cup D)'$  is the complement of  $(C \cup D)$ . What is  $P(D)$ ? (3p)
3. An IQ test was administered to a random sample of 100 sixth graders. The sample mean was 104,2 and the sample standard deviation was 12.
  - (a) Find a 95% confidence interval on the standard deviation  $\sigma$ . (3p)
  - (b) Find a 95% confidence interval on the mean. (2p)
  - (c) The true value of the mean is  $\mu = 107$ . Suppose we construct two intervals, a 90% and a 99% confidence interval on the mean based on the sample in (a). Only one of these intervals contains the true value of the mean. Which one? Explain your reasoning without computing the intervals. (1p)
4. Consider the function  $f$  defined by
 
$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x & x=1,2,3,\dots \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$
  - (a) Verify that  $f$  is the density function for a discrete random variable  $X$ . (2p)
  - (b) Find an expression for the cumulative distribution function  $F(x)$ . (2p)
  - (c) Calculate the probability  $P(3 \leq X < 7)$ . (2p)

5. Given a Markov chain with four states  $s_1, s_2, s_3, s_4$  with the following graph representation.



- (a) Write the transition matrix and state the absorbing states. (1p)
  - (b) Find the probability that the Markov chain will be in state  $s_3$  in two steps if the chain is currently in state  $s_4$ . (2p)
  - (c) Starting at state  $s_4$ , what is the expected number of steps to absorption? (3p)
6. (a) A moment generating function of a random variable is given by

$$m_X(t) = e^{\alpha t + \beta t^2}$$

for some constants  $\alpha$  and  $\beta$ . Express  $\alpha$  and  $\beta$  in terms of the mean  $\mu$  and the variance  $\sigma^2$  of  $X$ . (3p)

- (b) The moment generating function of a random variable following the Poisson distribution with parameter  $\lambda$  is given by

$$m_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

Let  $X$  and  $Y$  be two independent random variables following Poisson distributions with parameter  $\lambda_1$  and  $\lambda_2$  respectively. Prove using generating functions that  $Z = X + Y$  follows a Poisson distribution. Find the mean and the variance of  $Z$ . (3p)

## Svensk version

1. I en studie om en parasit som attackerar råttornas njurar är det känt att det genomsnittliga antalet parasier per njure är 3. Antag att antalet parasier per en njure följer en Poissonfördelning.
  - (a) Givet att en råtta har två njurar, beräkna sannolikheten att en råtta har mer än tre parasier. (1p)
  - (b) Beräkna sannolikheten att ha minst 9 smittade råttor i ett stickprov med 10 råttor. (2p)
2. Låt  $C$  och  $D$  vara två händelser. Antag att  $P(C) = 0.5$ ,  $P(C \cap D) = 0.2$  och  $P((C \cup D)') = 0.4$ , där  $(C \cup D)'$  är komplementtn av  $(C \cup D)$ . Beräkna  $P(D)$ . (3p)
3. Ett IQ-test administrerades till ett slumpmässigt stickprov på 100 sjätteklassare. Det stickprovsmedelvärdet var 104,2 och det stickprovs standardavvikelse var 12.
  - (a) Beräkna ett 95% konfidensintervall för standardavvikelsen  $\sigma$ . (3p)
  - (b) Beräkna ett 95% konfidensintervall för väntevärdet  $\mu$ . (2p)
  - (c) Det exakta medelvärdet är  $\mu = 107$ . Antag att vi konstruerar två intervall, ett 90% och ett 99% konfidensintervall för medelvärdet baserat på stickprovet i (a). Endast ett av dessa intervall innehåller det exakta medelvärdet. Vilket? Förklara hur du resonerar utan att beräkna intervallet. (1p)
4. Låt  $f$  vara funktionen given av
 
$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x & x=1,2,3,\dots \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$
  - (a) Visa att  $f$  är en täthetsfunktion till en diskret stokastisk variabel  $X$ . (2p)
  - (b) Ange ett uttryck för den kumulativa fördelningsfunktionen  $F(x)$ . (2p)
  - (c) Beräkna sannolikheten  $P(3 \leq X < 7)$ . (2p)
5. En Markovkedja med fyra tillstånd  $s_1, s_2, s_3, s_4$  är illustrerad i följande graf.
 

```

graph LR
    S1((S1)) -- "0.06" --> S3((S3))
    S3 -- "0.63" --> S4((S4))
    S4 -- "0.46" --> S3
    S4 -- "0.05" --> S2((S2))
    S2 -- "1" --> S2
  
```

  - (a) Skriv övergångsmatrisen och ange de absorberande tillstånden. (1p)
  - (b) Beräkna sannolikheten att markovkedjan övergår till tillstånd  $s_3$  givet att den är i tillstånd  $s_4$  för tillfället. (2p)
  - (c) Om man börjar i tillstånd  $s_4$ , vad är väntevärdet av antalet steg för att kedjan absorberas? (3p)

6. (a) En momentgenererande funktion till en stokastiskvariabel är given av

$$m_X(t) = e^{\alpha t + \beta t^2}$$

för konstanter  $\alpha$  och  $\beta$ . Skriv  $\alpha$  och  $\beta$  i termer av väntevärdet  $\mu$  och variansen  $\sigma^2$  av  $X$ .

(3p)

- (b) Den momentgenererande funktionen till en stokastisk variabel som har en poissonfördelning med parameter  $\lambda$  ges av

$$m_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Låt  $X$  och  $Y$  vara två oberoende stokastiska variabler som har Poisson fördelning med parameter  $\lambda_1$  respektive  $\lambda_2$ . Visa, med hjälp av genererande funktioner att  $Z = X + Y$  också har en poissonfördelning. Beräkna väntevärdet och variansen till  $Z$ .

(3p)

Lycka till!  
Nancy

## Tables

### Cumulative Poisson distribution

x	$\lambda$											
	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	
0	0.3679	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302	0.0183	0.0111	0.0067	0.0041	0.0025	
1	0.7358	0.5578	0.4060	0.2873	0.1991	0.1359	0.0916	0.0611	0.0404	0.0266	0.0174	
2	0.9197	0.8088	0.6767	0.5438	0.4232	0.3208	0.2381	0.1736	0.1247	0.0884	0.0620	
3	0.9810	0.9344	0.8571	0.7576	0.6472	0.5366	0.4335	0.3423	0.2650	0.2017	0.1512	
4	0.9963	0.9814	0.9473	0.8912	0.8153	0.7254	0.6288	0.5321	0.4405	0.3575	0.2851	
5	0.9994	0.9955	0.9834	0.9580	0.9161	0.8576	0.7851	0.7029	0.6160	0.5289	0.4457	
6	0.9999	0.9991	0.9955	0.9858	0.9665	0.9347	0.8893	0.8311	0.7622	0.6860	0.6063	
7	1.0000	0.9998	0.9989	0.9958	0.9881	0.9733	0.9489	0.9134	0.8666	0.8095	0.7440	
8	1.0000	1.0000	0.9998	0.9989	0.9962	0.9901	0.9786	0.9597	0.9319	0.8944	0.8472	
9	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9989	0.9967	0.9919	0.9829	0.9682	0.9462	0.9161	
10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9990	0.9972	0.9933	0.9863	0.9747	0.9574	
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9991	0.9976	0.9945	0.9890	0.9799	
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9980	0.9955	0.9912	
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9993	0.9983	0.9964	
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9994	0.9986	
15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9995	
16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	
17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	
18	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	□

### $\chi^2$ distribution

df	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.95}$	$\chi^2_{0.975}$	$\chi^2_{0.99}$
96	70.783	74.401	119.871	125.000	131.141
97	71.642	75.282	120.990	126.141	132.309
98	72.501	76.164	122.108	127.282	133.476
99	73.361	77.046	123.225	128.422	134.642
100	74.222	77.929	124.342	129.561	135.807

### T-distribution

df	$t_{0.90}$	$t_{0.95}$	$t_{0.975}$	$t_{0.99}$	$t_{0.995}$
80	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
95	1.291	1.661	1.985	2.366	2.629
98	1.290	1.661	1.984	2.365	2.627
99	1.290	1.660	1.984	2.365	2.626
100	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626

Anmärkning: I T- och  $\chi^2$ -tabeller är **d.f.** frihetsgrader (degrees of freedom).

$\chi_p^2$  betyder att  $p(\chi^2 \leq \chi_p^2) = p$  och  $t_p$  betyder att  $p(t \leq t_p) = p$  (arean till vänster).

Till exempel,  $p(\chi_{27}^2 \leq 11.808) = 0.005$  (d.f.=27) och  $p(t_{25} \leq 1.316) = 0.9$  (d.f.=25).