

TMV122/177 Inledande Matematik Z/TD

Skriv tentamenskoden tydligt på placeringlista och samtliga inlämnade papper.

Betygsgränser: 3: 20-29, 4: 30-39 och 5: 40-50.

För godkänt på kursen skall också Matlab-momentet vara godkänt.

Lösningar läggs ut på kursens webbsida. Resultat meddelas via Ladok senast tre veckor efter tentamenstillfället.

1. Denna uppgift finns på separat blad på vilket lösningar och svar skall skrivas. **Lösgör bladet och lämna in det som blad 1 tillsammans med övriga lösningar.** (14p)

Till följande uppgifter skall fullständiga lösningar inlämnas. **Endast svar ger inga poäng.**

2. (a) Bestäm ekvationen för det plan Π som är ortogonalt mot planet $x + y + z = 0$ och innehåller den linje ℓ som går genom punkterna $(1, 0, -1)$ och $(1, -2, 1)$. (3p)
- (b) Låt ℓ vara skärningslinjen mellan planen $\Pi_1 : z = -1$ och $\Pi_2 : x + y = 1$. Beräkna det minsta avståndet mellan punkten $(-1, -2, 1)$ och linjen ℓ . (3p)

3. Bestäm definitions- samt värdemängden för funktionen (6p)

$$f(x) = \exp(-x^2)\sqrt{4x^2 - 1}.$$

4. Låt f och g vara funktioner och $a, L, M \in \mathbb{R}$.

- (a) Skriv ned den exakta matematiska definitionen av (1p)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

- (b) Antag att $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$. Visa att (5p)

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M.$$

5. Rita grafen till funktionen (6p)

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}.$$

6. En triangel ABC har ett hörn i punkten $A = (-1, 0)$ och ett hörn i punkten $B = (1, 0)$. Hur liten kan triangelns omkrets vara om triangelns area är 1? (6p)

7. (a) Skriv ned definitionen av att en funktion f är kontinuerlig i en punkt $a \in D_f$. (1p)
- (b) Skriv ned definitionen av att en funktion f är deriverbar i en punkt $a \in D_f$. (1p)
- (c) Genom att använda definitionerna i (a) och (b), visa att funktionen (4p)

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x \geq 1 \\ \sin(\pi x/2), & x < 1 \end{cases}$$

är kontinuerlig men ej deriverbar i punkten $x = 1$.

Anonym kod	TMV122/177 Inledande Matematik Z/TD	2017-10-26	sidnr 1	Poäng
------------	-------------------------------------	------------	------------	-------

1. Till nedanstående uppgifter skall korta lösningar redovisas, samt svar anges, på anvisad plats (endast lösningar och svar på detta blad, och på anvisad plats, beaktas).

(a) Beräkna följande gränsvärden:

(3p)

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\tan x} - \frac{1}{\sin x} \right)$

ii. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{2x}$

Lösning:

.....

(b) Bestäm samtliga lösningar till det linjära ekvationssystemet

(3p)

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + y + z = 1 \end{cases}$$

Lösning:

.....

Var god vänd!

(c) Beräkna lutningen på ellipsen $\frac{(x-3)^2}{4} + (y-1)^2 = 2$ i punkten $(5, 2)$. (2p)

Lösning:

.....

(d) Beräkna vinkeln ϕ mellan vektorerna $\mathbf{x} = (1, 0, 1)$ och $\mathbf{y} = (1, 1, 0)$ om $0 \leq \phi \leq \pi$. (2p)

Lösning:

.....

(e) Visa att funktionen $T(x) = 1 + \sin(x/2)$ har en invers. (Du behöver ej beräkna inversen.) (2p)

Lösning:

.....

(f) Beräkna $g'(1)$ då $g(t) = \sin(\arccos(t/2))$. (2p)

Lösning:

.....

1. (a) (i) Genom omskrivningen

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\tan x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x}$$

får vi ett gränsvärde av typen $\frac{0}{0}$. Användning av l'Hôpitals regel ger

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x} = 0.$$

- (ii) Med $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}$ har vi

$$\ln y = 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

och användning av l'Hôpitals regel ger

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{1/x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = 2.$$

Detta ger att $y \rightarrow e^2$ då $x \rightarrow \infty$ eftersom e^x är kontinuerlig i $x = 2$.

- (b) Radreduktion ger

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right],$$

dvs. ekvationssystemet har den unika lösningen

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (c) Implicit derivering ger

$$\frac{2x}{4} + 2yy' = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{x}{4y},$$

vilket i punkten $(5, 2)$ ger lutningen

$$y' = -\frac{5}{4 \cdot 2} = -\frac{5}{8}.$$

- (d) Kom ihåg att

$$\mathbf{x} \bullet \mathbf{y} = |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}| \cdot \cos \phi \Leftrightarrow \cos \phi = \frac{\mathbf{x} \bullet \mathbf{y}}{|\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|},$$

vilket i detta fall ger

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

och därmed att $\phi = \pi/3$.

- (e) Vi observerar att

$$T'(x) = 1 + \frac{1}{2} \cos(x/2) > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

eftersom $\cos(x/2) \geq -1$. Detta medför att T är en strängt växande funktion och därmed injektiv vilket är precis det som krävs för att T ska vara inverterbar.

(f) Kedjeregeln ger att

$$g'(t) = \cos(\arccos(t/2)) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-t^2/4}} \right).$$

Genom att välja $t = 1$ får vi

$$g'(1) = -\cos(\arccos(1/2)) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-1/4}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

2. (a) Planet $x + y + z = 0$ har en normal $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$ och linjen som går genom punkterna $P = (1, 0, -1)$ och $Q = (1, -2, 1)$ har en riktningsvektor $\mathbf{v} = PQ = (0, 2, -2)$. En normal \mathbf{n}_Π till planet Π är alltså ortogonal mot både \mathbf{n} och \mathbf{v} och vi kan välja

$$\mathbf{n}_\Pi = \mathbf{n} \times \mathbf{v} = (-4, 2, 2).$$

Detta ger att Π har en ekvation av formen $-4x + 2y + 2z = D$ för något (reellt) tal D . Insättning av en punkt i planet, t.ex. P , ger $D = -6$. Alltså är $-2x + y + z = -3$ en ekvation för planet Π .

- (b) Om $y = t$ ger $x + y = 1$ att $x = 1 - t$, dvs. den skalärparametriska formen av skärningslinjen är

$$\ell : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R},$$

vilket ger den vektorparametriska formen

$$\ell : \mathbf{x} = (1, 0, -1) + t(-1, 1, 0), \quad t \in \mathbb{R},$$

och därmed punkten $\mathbf{x}_0 = (1, 0, -1)$ på linjen och riktningsvektorn $\mathbf{v} = (-1, 1, 0)$. Det sökta avståndet s mellan punkten $\mathbf{x} = (-1, -2, 1)$ och linjen ℓ kan nu beräknas enligt

$$s = \frac{|(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \times \mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|} = \frac{|(-2, -2, 2) \times (-1, 1, 0)|}{\sqrt{2}} = \frac{|(-2, 2, -4)|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{3}.$$

3. Kom ihåg att $\exp(t)$ och \sqrt{t} har definitionsmängderna \mathbb{R} respektive $[0, \infty)$. Vi har därmed

$$D_f = (-\infty, -1/2] \cup [1/2, \infty).$$

Eftersom funktionen är jämn ($f(-x) = f(x)$) behöver vi endast betrakta $x \in [1/2, \infty)$. Vi har $f(1/2) = 0$ och

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 - 1}}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\sqrt{4 - 1/x^2}}{e^{x^2}} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0$$

(där den sista likheten kan visas, t.ex., med l'Hôpitals regel). Genom att använda produkt- och kedjeregeln beräknar vi derivatan

$$f'(x) = -2x \exp(-x^2) \sqrt{4x^2 - 1} + e^{-x^2} \frac{8x}{2\sqrt{4x^2 - 1}} = \frac{-2x(4x^2 - 1) + 4x}{\sqrt{4x^2 - 1}} e^{-x^2} = \frac{2x(3 - 4x^2)}{\sqrt{4x^2 - 1}} e^{-x^2}.$$

Detta innebär att f är strängt växande på intervallet $(1/2, \sqrt{3}/2)$ och strängt avtagande på intervallet $(\sqrt{3}/2, \infty)$. På grund av att $f(1/2) = 0$ och ovanstående gränsvärde kan vi därmed konstatera att värdemängden $V_f = [0, f(\sqrt{3}/2)]$. Vi har

$$f(\sqrt{3}/2) = e^{-3/4} \sqrt{4 \cdot \frac{3}{4} - 1} = \sqrt{2} e^{-3/4}$$

och det slutgiltiga svaret blir

$$V_f = [0, \sqrt{2} e^{-3/4}].$$

4. (a) För varje $\epsilon > 0$ existerar $\delta > 0$ sådant att $0 < |x - a| < \delta$ medför att $|f(x) - L| < \epsilon$.
 (b) Se Example 4 i Section 1.5 i Adams & Essex, 'Calculus'.

5. Vi har $D_g = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Derivatans beräknas enligt

$$g'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{2x(x^2 - 4)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 - 1)^2},$$

vilket ger den enda kritiska punkten $x = 0$.

Vidare ges andraderivatans av

$$g''(x) = \frac{2}{(x^2 - 1)^2} - 2 \frac{4x^2}{(x^2 - 1)^3} = \frac{-6x^2 - 2}{(x^2 - 1)^3} \neq 0$$

och därmed saknas inflektionspunkter.

Vi har nu följande tabell

x		-1		0		1	
g'	-		-		+		+
g''	-		+		+		-
g	↘ konkav	ej def.	↘ konvex	min	↗ konvex	ej def.	↗ konkav


Eftersom

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 1$$

har vi vågräta asymptoter $y = 1$ då $x \rightarrow \pm\infty$. Vi har även lodräta asymptoter $x = \pm 1$ med

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} g(x) = \mp\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^\pm} g(x) = \pm\infty.$$

Slutligen observerar vi att grafen korsar x-axeln i punkterna $x = \pm 2$ och ritas grafen:



6. Låt C beteckna triangelns tredje hörn med koordinater (x, h) . Eftersom basen har längd 2 ges triangelns area av $A = \frac{2h}{2} = h$, och eftersom det är givet att $A = 1$ har vi $h = 1$. Det följer av Pythagoras sats att summan av längderna av sidorna AC och BC ges av

$$L(x) = \sqrt{(x+1)^2 + 1} + \sqrt{(x-1)^2 + 1}.$$

Genom att använda kedjeregeln beräknar vi derivatan

$$L'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} + \frac{x-1}{\sqrt{(x-1)^2 + 1}}$$

och andraderivatan

$$\begin{aligned} L''(x) &= \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} - \frac{(x+1)^2}{((x+1)^2 + 1)^{3/2}} + \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + 1}} - \frac{(x-1)^2}{((x-1)^2 + 1)^{3/2}} \\ &= \frac{1}{((x+1)^2 + 1)^{3/2}} + \frac{1}{((x-1)^2 + 1)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Vi observerar att $L'(0) = 0$ och att $L''(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Detta innebär att $x = 0$ är den globala minimumpunkten för $L(x)$ och därmed att triangelns minimala omkrets är

$$2 + L(0) = 2 + 2\sqrt{2} = 2(1 + \sqrt{2}).$$

7. (a) En funktion f är kontinuerlig i en punkt $a \in D_f$ om gränsvärdet $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existerar och $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- (b) En funktion f är deriverbar i en punkt $a \in D_f$ om gränsvärdet $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existerar.
- (c) Genom att använda att $2-x$ och $\sin(\pi x/2)$ är kontinuerliga funktioner beräknar vi gränsvärdena

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin(\pi x/2) = \sin(\pi/2) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2-x) = 2-1 = 1.$$

Detta ger att $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ existerar samt att $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ och vi har därmed visat att f är kontinuerlig i $x = 1$. Angående derivatan observerar vi att

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2 - (1+h) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (-1) = -1.$$

Genom att använda den trigonometriska additionsformeln

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

och gränsvärdet (man kan använda l'Hôpitals regel istället)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

härleder vi

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(\pi h/2)}{h} = 0.$$

Därmed existerar ej derivatan $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ eftersom ovanstående beräkningar visar att motsvarande höger- och vänstergränsvärden är olika.